

## ECHINODERMA

---

Les quelques Echinodermes recoltés par moi au Cameroun ont été examinés par M. le Dr. TH. MORTENSEN auquel je tiens à en exprimer ici ma respectueuse reconnaissance.

TH. MONOD.

### *Amphioplus occidentalis* KÖHLER

1914. *Amphioplus occidentalis* KÖHLER, Echinoderma I in : Beiträge zur Kenntniss der Meresfauna Westafrikas, lief. 2, pp. 201-203, pl. VII, figs. 5-8.

Cette Ophiure est connue du Libéria (Sinoe, Sass Town), du Dahomey (Ouidah) et du Congo français (fleuve Nyango); elle est nouvelle pour le Cameroun.

Je l'ai rencontrée communément au large de Kribi, en compagnie de *Rhopalodina lageniformis* GRAY, sur fond de vase.

Nom vulgaire en batanga : *ngokolo a tube*, mille-patte de mer.

### *Arbacia* sp.

J'ai recueilli sur la plage, entre Grand Batanga et Campo un certain nombre de tests qui appartiennent soit à *Arbacia africana* TROSCHEL soit à *A. livula* LINNÉ.

*A. africana* est déjà signalé au Cameroun, sur la côte d'Angola,

aux îles San Thomé et Las Rolas ; *A. lixula* provient probablement (?) *vide* LOVEN, du Libéria et de l'île San Thome.

*Rotula orbiculus* (LINNÉ)

Nombreux exemplaires morts sur la plage du côté atlantique de la presqu'île de Souelaba.

*Rotula deciesdigitata* (LESKE)

Quelques spécimens morts sur la plage à Grand Batanga et un peu au nord de Campo (janvier 1926).

*Rhopalodina lageniformis* GRAY

Il n'est pas absolument certain que mes échantillons appartiennent à l'espèce de GRAY et il n'est pas impossible qu'il existe d'autres formes de *Rhopalodina*. L'état des spécimens cependant n'a pas permis au D<sup>r</sup> TH. MORTENSEN de se prononcer sur ce point.

J'ai rencontré cette forme dans la baie de Douala (estomac d'un poisson, *Arius* sp. (*A. Heudeloti* C. V. ou *A. latiscutatus* GÜNTHER) et au large de Kribi, par des fonds de vase de quelques brasses, le 30 décembre 1925.

*Cucumaria* sp.

1 specimen indéterminable ; Souelaba, estomac d'un poisson *Arius* sp.)

A la suite de l'inventaire de ma très petite collection d'Echinodermes camérouniens je crois utile de citer les espèces déjà connues de cette colonie et non retrouvées par moi-même :

*Pentaceros dorsatus* (LINNÉ), Douala, VON EITZEN *legit.* (KÆHLER *loc. cit.*, p. 168).

*Asterina marginata* HUPÉ (KÆHLER, *loc. cit.*, pp. 171-173).

*Ophiarachnella africana* KÆHLER, *loc. cit.*, pp. 178-181, pl. IX, fig 8, 9, 17.

*Amphioplus congensis* (STUDER) (KÆHLER, *loc. cit.*, pp. 199-201).

*Echinometra lucunter* (LINNÉ) (KÆHLER, *loc. cit.*, pp. 249-250, pl. XV, fig. 83-84).