

Extrait des *Annales de la Société Belge de Médecine Tropicale*.
Tome XXX — N° 6 — 1950.
(Pages 1477-1482.)

Tumeurs néoplasiques bénignes et malignes chez le Noir de race Bahutu au Ruanda-Urundi.

PAR

Alex FAIN.

(Reçu pour publication le 13 juillet 1950.)

Les tumeurs que nous relatons ici ont été diagnostiquées dans le service d'histo-pathologie du Laboratoire d'Astrida au cours des années 1948 et 1949.

L'ensemble de notre matériel comprend 90 tumeurs; il consiste essentiellement en biopsies ou pièces opératoires prélevées par différents chirurgiens du Ruanda-Urundi. Ce qui fait l'intérêt de ce matériel, c'est la diversité des tumeurs malignes rencontrées bien plus que leur nombre qui n'atteint que 49 au total. Nous y remarquons, en effet, quelques tumeurs très rarement signalées chez le Congolais comme le lymphogranulome de Hodgkin, la tumeur embryonnaire de Wilms, la tumeur mixte, etc. Signalons aussi un épithélioma de la prostate qui nous paraît être le premier cas diagnostiqué jusqu'à présent chez le noir Congolais.

Tumeurs bénignes.

1. *Tumeurs du Mésenchyme :*

- 9 *fibromes* : ils se répartissent comme suit : Face 2; Cou 1; Tronc 3; membres 3. Deux de ces fibromes étaient récidivants.
- 1 *chéloïde* : au niveau du pavillon de l'oreille.
- 1 *myxome* : localisé au scrotum. La tumeur évoluait lentement depuis un an.
- 1 *angiofibrome* : petit angiome en partie caverneux de la jambe.
- 1 *hémangiome* de la vulve.
- 1 *lymphangiome* polykystique du cou.
- 1 *ostéome* du maxillaire supérieur.

penser à une grossesse de 5 mois. L'examen clinique et les épreuves de laboratoire ayant exclu le diagnostic de grossesse, on pratiqua la laparotomie qui révéla un envahissement des deux ovaires et de l'utérus par des masses tumorales. L'hystérectomie totale fut pratiquée par le Dr Steyaert et les pièces qui nous furent soumises révélèrent qu'il s'agissait de lymphosarcomes ayant envahi les ovaires et l'utérus. La tumeur du sein ne fut pas extirpée, son allure clinique ~ croissance rapide, absence de ganglions satellites ~ traduisait clairement sa nature.

Rhabdomyosarcomes (Sarcomes polymorphes).

4 cas : un dans la région parotidienne (homme 58 ans); un rétropéritonéal (âge ?); un de la jambe (âge ?); un du cordon spermatique chez un jeune garçon. Le Dr Vanderick de Kabgayi, qui nous a envoyé la pièce, avait posé le diagnostic clinique de rhabdomyosarcome.

Fibrosarcomes.

5 cas : un du maxillaire supérieur (âge ?); un de la hanche (homme de 17 ans); un de la paroi abdominale (homme de 40 ans); un de la jambe (homme de 16 ans); un du pied (homme de 30 ans).

Réticulose maligne.

1 cas chez un homme adulte. La tumeur, unique, du volume d'un œuf environ, était située dans le creux de l'aîne.

Histiocytome malin.

1 cas au niveau de la cuisse, chez un homme âgé de 25 ans.

Symphome (Ganglioneurome).

Un cas chez un homme de 45 ans, au niveau de l'orbite.

4. *Lymphogranulomatose maligne (Maladie de Hodgkin) :*

Diagnostiqué une seule fois. Il s'agissait d'un volumineux ganglion intra-abdominal extirpé chez un homme de 40 ans. Bien que l'image histologique ne fut pas très typique à cause de l'absence d'éosinophiles et de plasmocytes dans l'exsudat, le diagnostic put cependant être posé avec certitude grâce à la présence de nombreuses et volumineuses cellules de Sternberg.

5. *Tumeurs mixtes :*

3 cas : 1 tumeur mixte du palais osseux chez un enfant; 1 tumeur mixte de la glande parotide chez un adulte; 1 tumeur mixte de la glande sous-maxillaire (âge ?).

6. *Tumeurs de Wilms (Dysembryomes complexes du rein) :*

2 cas chez des enfants dont l'un était âgé de 6 ans; l'âge exact de l'autre nous est inconnu.

En terminant cette note, nous tenons à exprimer notre vive gratitude à M. le Professeur Brusselmans, de l'Université de Louvain, qui a bien voulu examiner la plus grande partie de notre matériel et contrôler nos déterminations.

Nous sommes également reconnaissant à M. le Professeur Firket, de l'Université de Liège, pour les excellents conseils qu'il nous a prodigués à l'occasion de la visite qu'il fit au Laboratoire d'Astrida au cours de l'année 1948.

(Laboratoire d'Astrida.)

Résumé. — Sur 90 tumeurs néoplasiques diagnostiquées chez des indigènes de race Bahutu, au Ruanda-Urundi, 49 sont malignes et comprennent 21 épithéliomas, 15 sarcomes, 7 tumeurs mélaniques malignes, 1 Hodgkin, 3 tumeurs mixtes et 2 tumeurs de Wilms.

Un cas d'épithélioma de la prostate a été diagnostiqué dans ce nombre, à notre connaissance c'est le premier cas diagnostiqué jusqu'à présent au Congo Belge et probablement en Afrique centrale.

Samenvatting. — Op 90 neoplastische gezwellen bij inboorlingen van Bahutu ras gediagnosticeerd, waren er 49 kwaadaardige, waaronder 21 epitheliomas, 15 sarcomas, 7 melanische kwaadaardige gezwellen, 1 Hodgkin, 3 gemengde gezwellen en 2 gezwellen van Wilms.

Hierbij werd een epithelioma van de voorstandsklier begrepen, en dit is, naar wij menen, het eerste beschreven geval in Belgisch Congo, en misschien zelfs in Centraal Afrika.
