

DIVISION SUBGENERIQUE DU GENRE **PROLISTROPHORUS** FAIN, 1970

par A. FAIN

Le genre *Prolistrophorus* FAIN, 1970 a été créé pour grouper des espèces de Listrophoridae présentant un écusson postscapulaire médian incomplet dans sa partie médiane. Ou bien le bord antérieur ou postérieur de ces écusson est profondément échancré ou bien sa partie médiane porte une zone ovalaire striée et non ponctuée.

La découverte de nouvelles espèces dans ce genre nous oblige à ériger deux nouveaux sous-genres :

1. Sous-genre *Prolistrophorus* FAIN, 1970 : Mâle avec un seul écusson hysteronotal médian ; bord postérieur du corps découpé en 2 lobes portant des poils *d* 5 piliformes ou foliacés.

Espèce type : *Listrophorus argentinus* HIRST, 1921.

2. Sous-genre *Aprolistrophorus* **subg. n.** : Mâle avec deux écussons hysteronotaux paramédians séparés ; bord postérieur du corps avec 2 lobes bien développés portant des poils *d* 5 piliformes.

Espèce type : *Listrophorus sparsilineatus* (FAIN, 1970).

3. Sous-genre *Beprolistrophorus* **subg. n.** : Mâle avec 2 écussons hysteronotaux paramédians séparés ; bord postérieur du corps tronqué et droit, portant des poils piliformes ou foliacés.

Espèce type : *Listrophorus bakeri* RADFORD, 1949.