

Institut royal des Sciences
naturelles de Belgique

BULLETIN

Tome XXVI, n° 57.
Bruxelles, décembre 1950.

Koninklijk Belgisch Instituut
voor Natuurwetenschappen

MEDEDELINGEN

Deel XXVI, n° 57.
Brussel, December 1950.

LISTE DES SUCTORIA (APHANIPTERA)
RÉCOLTÉS EN BELGIQUE,
par Jean COOREMAN (Bruxelles).

Aucune liste faunistique des *Suctoria* de notre pays n'a été publiée depuis 1900 (1). Nous croyons utile de donner la liste des espèces constituant à ce jour les collections de l'Institut royal des Sciences naturelles. Elles furent recueillies au cours de ces dernières années. La répartition de ces parasites étant celle des hôtes qu'ils fréquentent, il est évident que la liste des localités mentionnées ne doit pas être entendue au sens restrictif.

PULICIDÆ.

Pulex irritans irritans LINNÉ, 1758

Hôte : *Homo sapiens* LINNÉ.

Localités : Diverses.

Distribution : Cosmopolite.

Ctenocephalides canis (CURTIS, 1826).

Hôtes : *Canis familiaris* LINNÉ ; *Putorius putorius putorius* LINNÉ ; *Vulpes vulpes crucigera* (BECHSTEIN).

Localités : Bruxelles, Liège, Anvers, Edegem, Watermael-Boitsfort.

Distribution : Cosmopolite.

(LAMEERE = *serraticeps* GERVAIS, non *canis* DUGÈS.)

(1) LAMEERE, A., 1900, *Manuel de la Faune de Belgique*. Tome II. (Bruxelles.)

Ctenocephalides felis felis (BOUCHÉ, 1835).

Hôtes : *Felis domestica* (LINNÉ) ; *Canis familiaris* LINNÉ ;
Capreolus capreolus capreolus (LINNÉ).

Localités : Bruxelles, Watermael - Boitsfort, Edegem, Recht.

Distribution : Cosmopolite.

(LAMEÈRE : = *canis* DUGÈS.)

Archæopsylla erinacei erinacei (BOUCHÉ, 1835).

Hôtes : *Erinaceus europæus europæus* LINNÉ ; *Canis familiaris* LINNÉ ; *Putorius putorius putorius* LINNÉ.

Localités : Watermael, Liège, Namur, Edegem, Deurne, Wijnegem.

Distribution : Europe.

Spilopsyllus cuniculi (DALE, 1878).

Hôte : *Oryctolagus cuniculus* (LINNÉ) ; *Lepus europæus europæus* PALLAS.

Localités : Wavreille, Bure, Stockai (Hautes Fagnes).

Distribution : Allemagne, Angleterre, Belgique, Irlande, Italie, Pays-Bas, Suisse.

(LAMEÈRE : = *goniocephalus* TASCHENBERG.)

VERMIPSYLLIDÆ.

Chætopsylla trichosa KOHAUT, 1903.

Hôte : *Meles meles meles* LINNÉ.

Localité : Eelen.

Distribution : Europe.

(LAMEÈRE : confusion probable avec *globiceps* TASCHENBERG.)

ISCHNOPSYLLIDÆ.

Ischnopsyllus hexactenus hexactenus (KOLENATI, 1857).

Hôtes : *Barbastella* sp. ; *Plecotus auritus* (LINNÉ) ; *Rhinolophus hipposideros hipposideros* (BECHSTEIN) ; *Myotis myotis* (BORKHAUSEN) ; *Myotis mystacinus* (KÜHL).

Localités : Beaugard (grotte de Monceau), Denée-Marelsous (Carrière souterraine), Liège (grotte du Bay-Bonnet), Vechmael-lez-Oreye (grotte d'Henisdael), Maastricht.

Distribution : Allemagne, Belgique, Danemark, France, Pays-Bas, Suède, Suisse, Yougoslavie, U. R. S. S.

Ischnopsyllus intermedius (ROTHSCHILD, 1898).

Hôtes : *Myotis dasycneme* (BOIE) ; *Myotis myotis* (BORKHAUSEN) ; *Myotis daubentoni* (KUHLE) ; *Myotis mystacinus* (KUHLE).

Localités : Vechmael-lez-Oreye (grotte d'Henisdael) ; Engihoul (grande caverne), Maastricht.

Distribution : Allemagne, Angleterre, Belgique, Hongrie, Pays-Bas, Portugal, Suisse.

(LAMEERE : = probablement, partim *octactenus* KOLENATI.)

Ischnopsyllus simplex simplex ROTHSCHILD, 1906.

Hôtes : *Plecotus auritus* LINNÉ ; *Myotis myotis* (BORKHAUSEN) ; *Myotis daubentoni* (KUHLE) ; *Myotis mystacinus* (KUHLE).

Localité : Vechmael-lez-Oreye (grotte d'Henisdael).

Distribution : Europe occidentale.

Rhinolophosylla unipectinata unipectinata

(TASCHENBERG, 1880).

Hôtes : *Rhinolophus ferrum-equinum ferrum-equinum* (SCHREBER) ; *Rhinolophus hipposideros hipposideros* (BECHSTEIN) ; *Myotis myotis* (BORKHAUSEN).

Localités : Engihoul (grande caverne), Bearegard (grotte de Monceau), Goyet, Maastricht.

Distribution : Belgique, France, Hongrie, Pays-Bas, Suisse, Yougoslavie.

Nycteridopsylla pentactena (KOLENATI, 1857).

Hôtes : *Plecotus auritus* LINNÉ ; *Myotis myotis* (BORKHAUSEN) ; *Myotis* sp.

Localités : Tailfer (grotte Alexandre), Bearegard (grotte de Monceau), Engihoul (grande caverne).

Distribution : Allemagne, Belgique, Hongrie, Pays-Bas, Suisse.

HYSTRICHOPSYLLIDÆ.**Hystrichopsylla talpæ** (CURTIS, 1826).

Hôtes : *Talpa europæa* LINNÉ ; *Putorius putorius putorius* LINNÉ ; *Microtus arvalis arvalis* (PALLAS) ; *Microtus* sp. ; *Cricketus cricetus* LINNÉ ; *Micromys minutus soricinus* (HERMANN).

Localités : Boitsfort-Bruxelles, Ohain, Groenendael, Woluwe-St-Lambert, Epegem, Esschen, Lasne, Oud-Turnhout, Walem, Velaines, Nismes.

Distribution : Europe occidentale.

Typhloceras poppei WAGNER, 1903.

Hôte : recueilli dans un trou sur le sol (probablement : *Apodemus sylvaticus* LINNÉ).

Localité : Andrimont-lez-Verviers (trou des Sottais). (Rec. R. LERUTH.)

Distribution : Allemagne, Angleterre, Belgique, Pays Bas, Suisse, Yougoslavie, Nord de l'Afrique.

Palæopsylla minor (DALE, 1878).

Hôte : *Talpa europæa* L.

Localités : Bruxelles, Basse-Wavre, Epegem, Esschen, Hockai, Oud-Turnhout, Torgny, Nismes, Wavreille.

Distribution : Allemagne, Angleterre, Belgique, France, Pays-Bas, Suisse.

(LAMBÈRE : = *gracilis* TASCHENBERG.)

Palæopsylla sorecis sorecis (DALE, 1878).

Hôte : *Sorex araneus araneus* LINNÉ.

Localité : Boitsfort-Bruxelles.

Distribution : Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Finlande, Hongrie, Pays-Bas, Suisse.

Leptopsylla segnis (SCHÖNHERR, 1816).

Hôte : *Mus musculus musculus* LINNÉ.

Localité : Bruxelles.

Distribution : Europe, Asie, Amérique.

(LAMBÈRE : = *musculi* DUGÈS.)

Ctenophthalmus agyrtes (HELLER, 1896).

Hôtes : *Apodemus sylvaticus sylvaticus* (LINNÉ) ; *Cricetus cricetus* (LINNÉ) ; *Talpa europæa* LINNÉ ; *Putorius putorius putorius* LINNÉ ; *Microtus* sp.

Localités : Boitsfort - Bruxelles, Ohain, Groenendael, Lasne, Oud-Turnhout, Vilvorde, Beauvechain, Wavreille, Esschen, Eupen, Nismes, Torgny, Bure, Hockai, Forêt de Meerdael, Louvain.

Distribution : Europe.

(LAMBÈRE : = *assimilis* TASCHENBERG.)

Ctenophthalmus bisoctodentatus (KOLENATI, 1863).

Hôtes : *Talpa europaea* L.; *Putorius putorius putorius* LINNÉ; *Cricetus cricetus* (LINNÉ); *Microtus arvalis arvalis* (PALLAS); *Evotomys glareolus glareolus* (SCHREBER); Nids endoxyles de *Picus viridis viridis* LINNÉ (fréquentés par des petits Rongeurs).

Localités : Boitsfort - Bruxelles, Wavre, Lasne, Woluwe-St-Lambert, Walem, Velaines, Beauvechain, Eelen, Es-schen, Oud-Turnhout, Meerbeek, Nismes, Torgny.

Distribution : Europe.

Euctenophthalmus assimilis (TASCHENBERG, 1880).

Hôte : *Talpa europæe* L.

Localités : Wavreille, Torgny.

Distribution : Allemagne, Belgique, France, Pays-Bas, Suisse, Sibérie.

(LAMEERE : non *assimilis* TASCHENBERG, sensu LAMEERÉ.)

Euctenophthalmus congener (ROTHSCHILD, 1907).

Hôtes : *Talpa europaea* LINNÉ; *Apodemus sylvaticus sylvaticus* LINNÉ.

Localités : Boitsfort-Bruxelles, Vilvorde, Oud-Turnhout, Nismes.

Distribution : Allemagne, Autriche, Belgique, Pays-Bas, Suisse, Yougoslavie, Sibérie.

Rectofrontia pentacanthus (ROTHSCHILD, 1897).

Hôtes : *Talpa europaea* LINNÉ; *Apodemus sylvaticus sylvaticus* LINNÉ.

Localités : Vilvorde, Oud-Turnhout.

Distribution : Allemagne, Angleterre, Belgique, France, Hongrie, Pays-Bas, Suisse.

Rectofrontia isacanthus (ROTHSCHILD, 1907).

Hôtes : *Apodemus sylvaticus sylvaticus* LINNÉ; *Pitymys subterraneus subterraneus* SELYS-LONGCHAMPS.

Localités : Groenendael, Anseremme.

Distribution : Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Finlande, Italie, Yougoslavie.

DOLICHOPSYLLIDÆ.

Myoxopsylla laverani (ROTHSCHILD, 1911).Hôte : *Eliomys quercinus* (LINNÉ).

Localité : Pétigny.

Distribution : Belgique, France, Portugal, Sardaigne, Suisse, Afrique du Nord.

Paraceras melis (CURTIS, 1832).Hôte : *Meles meles meles* LINNÉ.

Localités : Floreffe, Eelen, Bure, Houx.

Distribution : Toute la région paléarctique.

(LAMEÈRE : = *melis* WALKER.)*Nosopsyllus fasciatus* (BOSC D'ANTIC, 1801).Hôtes : *Rattus norvegicus* (ERXLEBEN) ; *Mus musculus musculus* LINNÉ.

Localités : Moorsel, Watermael-Boitsfort, Edegem.

Distribution : Cosmopolite.

Monopsyllus sciurorum sciurorum (SCHRANK, 1803).Hôtes : *Sciurus vulgaris russus* MILLER ; *Cricetus cricetus* LINNÉ ; *Erinaceus europæus europæus* LINNÉ ; *Martes foina foina* LINNÉ ; *Putorius putorius putorius* LINNÉ ; *Eliomys quercinus* (LINNÉ) ; *Microtus* sp. ; *Rattus norvegicus* (ERXLEBEN) ; *Glis glis* LINNÉ ; dans des nids de *Parus major major* LINNÉ ; *Picus viridis viridis* LINNÉ ; *Colæus monedula spermologus* VIEILLOT ; *Sturnus vulgaris vulgaris* LINNÉ ; *Columba ænas ænas* LINNÉ.

Localités : Dans toute la Belgique.

Distribution : Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, France, Grèce, Hongrie, Finlande, Italie, Pays-Bas, Suède, Suisse, U. R. S. S., Transcaucasie, Turkestan, Madagascar.

(LAMEÈRE : = *sciurorum* BOUCHÉ.)*Trichopsylla penicilliger penicilliger* (GRUBE, 1852).Hôte : Dans une microcaverne endoxyle (*Ulmus campestris* LINNÉ), fréquentée par de petits Rongeurs.

Localité : Bruxelles.

Distribution : Angleterre, Autriche, Belgique, Ecosse, Finlande, Hongrie, Norvège, Pays-Bas, Suisse, Yougoslavie, Japon, Sibérie.

Trichopsylla walkeri (ROTHSCHILD, 1902).

Hôte : *Mustela nivalis nivalis* LINNÉ ; probablement *Apodemus sylvaticus sylvaticus* LINNÉ.

Localités : Bruxelles, Wavreille.

Distribution : Allemagne, Angleterre, Belgique, Ecosse, Finlande, France, Pays-Bas, U. R. S. S.

Trichopsylla turbida (ROTHSCHILD, 1909).

Hôtes : *Apodemus sylvaticus sylvaticus* LINNÉ ; *Pitymys subterraneus subterraneus* (SELYS-LONGCHAMPS) ; *Talpa europaea* LINNÉ.

Localités : Bruxelles, Vilvorde, Louvain, Lasne, Oud-Turnhout, Hockai.

Distribution : Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, France, Islande, Pays-Bas, Yougoslavie, Suisse, U.R.S.S.

Ceratophyllus gallinæ gallinæ (SCHRANK, 1803).

Hôtes : *Parus major major* LINNÉ ; *Picus viridis viridis* LINNÉ ; *Columba œnas œnas* LINNÉ ; *Delichon urbica urbica* LINNÉ ; *Passer montanus montanus* LINNÉ ; nids de Passereaux indéterminés ; *Martes foina foina* ERXLEBEN ; diverses micro-cavernes endoxyles et nid de *Lasius niger* LINNÉ.

Localités : Bruxelles, Watermael-Boitsfort, Ohain, Grimbergen, Celles, Ciergnon, Basse-Wavre, Eelen, Hatrival, Houx.

Distribution : Cosmopolite.

(LAMEERE : = *gallina* BOUCHÉ, *partim*.)

Ceratophyllus hirundinis (CURTIS, 1832).

Hôte : *Delichon urbica urbica* LINNÉ.

Localités : Evreux, Nismes, Wavreille.

Distribution : Allemagne, Angleterre, Belgique, France, Italie, Suède, Suisse, Pays-Bas, U. R. S. S., Afrique du Nord.

Ceratophyllus fringillæ (WALKER, 1856.)

Hôtes : *Passer domesticus* LINNÉ ; *Parus major major* LINNÉ ;
Sturnus vulgaris vulgaris LINNÉ.

Localités : Bruxelles, Boitsfort, Wavreille.

Distribution : Belgique, Finlande, Pays-Bas.

(LAMEERE : = *gallinæ* BOUCHÉ, *partim*.)

Ceratophyllus vagabundus (BOHEMAN, 1866.)

Hôte : *Colæus monedula monedula* LINNÉ.

Localité : Godinne.

Distribution : Asie, Europe boréale, Alaska.

Ceratophyllus styx (ROTHSCHILD, 1900.)

Hôte : *Riparia riparia riparia* LINNÉ.

Localités : Maransart, Waterloo.

Distribution : Allemagne, Angleterre, Belgique, Finlande, Pays-Bas, Suède, Suisse.

Ceratophyllus garei garei (ROTHSCHILD, 1902.)

Hôtes : *Fringilla caelebs caelebs* LINNÉ ; *Anthus trivialis trivialis* LINNÉ ; accidentellement : nid de *Rattus rattus rattus* LINNÉ.

Localités : Wavre, Bure, Wavreille.

Distribution : Allemagne, Angleterre, Belgique, Caucase, Ecosse, Finlande, Pays-Bas, Alaska, Canada, Etats-Unis.

Ceratophyllus rusticus WAGNER, 1903.

Hôte : *Delichon urbica urbica* LINNÉ.

Localité : Nismes.

Distribution : Allemagne, Angleterre, Belgique, Finlande, Suisse, Yougoslavie.

Dasypsyllus gallinulæ gallinulæ (DALE, 1878.)

Hôtes : *Fringilla caelebs caelebs* LINNÉ ; *Troglodytes troglodytes occidentalis* VERHEYEN.

Localités : Bruxelles, Groenendael, Wavreille.

Distribution : Angleterre, Belgique, Ecosse, Pays-Bas, Portugal, Suisse.

LISTE DES HÔTES.

MAMMIFÈRES.

- Apodemus sylvaticus sylvaticus* (LINNÉ).
Ctenophthalmus agyrtes (HELLER).
Typhlocerus poppei (WAGNER).
Euctenophthalmus congener (ROTHSCHILD).
Rectofrontia pentacanthus (ROTHSCHILD).
Rectofrontia isacanthus (ROTHSCHILD).
Trichopsylla walkeri (ROTHSCHILD).
Trichopsylla turbida (ROTHSCHILD).
- Barbastella* sp.
Ichnopsyllus hexactenus (KOLENATI).
- Canis familiaris* LINNÉ.
Ctenocephalides canis (CURTIS).
Ctenocephalides felis (BOUCHÉ).
Archavopsylla erinacci (BOUCHÉ).
- Capreolus capreolus capreolus* (LINNÉ).
Ctenocephalides felis (BOUCHÉ).
- Cricetus cricetus* (LINNÉ).
Hystrichopsylla talpæ (CURTIS).
Ctenophthalmus agyrtes (HELLER).
Ctenophthalmus bisoctodentatus (KOLENATI).
Monopsyllus sciurorum (SCHRANK).
- Eliomys quercinus* (LINNÉ).
Myoxopsylla lacranii (ROTHSCHILD).
Monopsyllus sciurorum (SCHRANK).
- Erinaceus europæus europæus* LINNÉ.
Archavopsylla erinacci erinacci (BOUCHÉ).
Monopsyllus sciurorum (SCHRANK).
- Evotomys glareolus glareolus* (SCHREB.).
Ctenophthalmus bisoctodentatus (KOLENATI).
- Felis domestica* (LINNÉ).
Ctenocephalides felis (BOUCHÉ).
- Glis glis glis* (LINNÉ).
Monopsyllus sciurorum (SCHRANK).

Homo sapiens LINNÉ.

Pulex irritans LINNÉ.

Myotis dasycneme (BOIE).

Ischnopsyllus intermedius (ROTHSCHILD).

Myotis daubentonii (KÜHL).

Ischnopsyllus intermedius (ROTHSCHILD).

Ischnopsyllus simplex ROTHSCCHILD.

Myotis myotis (BORKHAUSEN).

Ischnopsyllus hexactenus (KOLENATI).

Ischnopsyllus intermedius (ROTHSCHILD).

Ischnopsyllus simplex ROTHSCCHILD.

Rhinolophopsylla unipectinata (TASCHENBERG).

Nycteridopsylla pentactena (KOLENATI).

Myotis mystacinus (KÜHL).

Ischnopsyllus hexactenus (KOLENATI).

Ischnopsyllus intermedius (ROTHSCHILD).

Ischnopsyllus simplex ROTHSCCHILD.

Myotis sp.

Nycteridopsylla pentactena (KOLENATI).

Lepus europæus europæus PALLAS.

Spilopsyllus cuniculi (DALE).

Martes foina foina (ERXLEBEN).

Monopsyllus sciurorum (SCHRANK).

Ceratophyllus gallinae (SCHRANK).

Meles meles meles (LINNÉ).

Chaetopsylla trichosa KOHAUT.

Paraceras melis (CURTIS).

Micromys minutus soricinus (HERMANN).

Hystrihopsylla talpæ (CURTIS).

Microtus arvalis arvalis (PALLAS).

Hystrihopsylla talpæ (CURTIS).

Ctenophthalmus bisocotodentatus (KOLENATI).

Microtus sp.

Hystrihopsylla talpæ (CURTIS).

Monopsyllus sciurorum (SCHRANK).

Mus musculus musculus LINNÉ.

Leptopsylla segnis (SCHÖNHERR).

Nosopsyllus fasciatus (BOSC).

- Mustela nivalis nivalis* LINNÉ.
Trichopsylla walkeri (ROTHSCHILD).
- Oryctolagus cuniculus* (LINNÉ).
Spilopsyllus cuniculi (DALE).
- Pitymys subterraneus subterraneus* (SELYS-LONGCHAMPS).
Rectofrontia isacanthus (ROTHSCHILD).
Trichopsylla turbida (ROTHSCHILD).
- Plecotus auritus* (LINNÉ).
Ischnopsyllus hexactenus KOLENATI.
Ischnopsyllus simplex ROTHSCCHILD.
Nycteridopsylla pentactena KOLENATI.
- Putorius putorius putorius* LINNÉ.
Ctenocephalides canis (CURTIS).
Archæopsylla erinacei (BOUCHÉ).
Hystrichopsylla talpæ (CURTIS).
Ctenophthalmus agyrtes (HELLER).
Ctenophthalmus bisectodentatus KOLENATI.
Monopsyllus sciurorum (SCHRANK).
- Rattus norvegicus* (ERXLEBEN).
Nosopsyllus fasciatus (BOSC).
Monopsyllus sciurorum (SCHRANK).
- Rattus rattus rattus* LINNÉ.
Ceratophyllus garei garei ROTHSCCHILD.
- Rhinolophus ferrum-equinum ferrum-equinum* (SCHREBER).
Rhinolophopsylla unipectinata TASCHEBERG.
- Rhinolophus hipposideros hipposideros* (BECHSTEIN).
Ischnopsyllus hexactenus KOLENATI.
Rhinolophopsylla unipectinata (TASCHEBERG).
- Sciurus vulgaris russus* MILLER.
Monopsyllus sciurorum (SCHRANK).
- Sorex sorcx araneus* LINNÉ.
Palæopsylla sorecis (DALE).
- Talpa europæa* LINNÉ.
Hystrichopsylla talpæ (CURTIS).
Palæopsylla minor (DALE).
Ctenophthalmus bisectodentatus (KOLENATI).
Euctenophthalmus assimilis (TASCHEBERG).
Euctenophthalmus congener (ROTHSCCHILD).
Rectofrontia pentacanthus (ROTHSCCHILD).
Trichopsylla turbida (ROTHSCCHILD).

Vulpes vulpes crucigera BECHSTEIN.

Ctenocephalides canis (CURTIS).

OISEAUX.

Anthus trivialis trivialis LINNÉ.

Ceratophyllus garei garei ROTHSCHILD.

Fringilla cælebs cælebs LINNÉ.

Ceratophyllus garei garei ROTHSCHILD.

Dasypsyllus gallinulæ gallinulæ (DALE).

Colæus monedula spermologus (VIEILLOT).

Ceratophyllus vagabundus (BOHEMAN).

Monopsyllus sciurorum (SCHRANK), (nid).

Columba ænas ænas LINNÉ.

Ceratophyllus gallinæ (SCHRANK).

Monopsyllus sciurorum (SCHRANK), (nid).

Delichon urbica urbica LINNÉ.

Ceratophyllus gallinæ (SCHRANK).

Ceratophyllus hirundinis (CURTIS).

Ceratophyllus rusticus WAGNER.

Parus major major LINNÉ.

Ceratophyllus gallinæ (SCHRANK).

Ceratophyllus fringillæ (WALKER).

Monopsyllus sciurorum (SCHRANK), (nid).

Passer domesticus domesticus LINNÉ.

Ceratophyllus fringillæ (WALKER).

Passer montanus montanus (LINNÉ).

Ceratophyllus gallinæ (SCHRANK).

Picus viridis viridis LINNÉ.

Ceratophyllus gallinæ (SCHRANK).

Monopsyllus sciurorum (SCHRANK), (nid).

Otenophthalmus bisectodentatus KOLENATI, (nid).

Riparia riparia riparia (LINNÉ).

Ceratophyllus styx (ROTHSCHILD).

Sturnus vulgaris vulgaris LINNÉ.

Monopsyllus sciurorum (SCHRANK), (nid).

Ceratophyllus fringillæ (WALKER).

Troglodytes troglodytes occidentalis VERHEYEN.

Dasypsyllus gallinulæ (DALE).

INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE.